

## Syllabus Overview:

### Theory

<i>Unit</i>	<i>Content</i>	<i>Hours/Week</i>
<i>1</i>	Composition and structure of atmosphere; Heating and cooling of the atmosphere: Radiation, advection, conduction and convection; Insolation and factors affecting insolation; Heat budget; Horizontal and vertical distribution of temperature; Inversion of temperature; Isotherms: Their characteristics.	<i>3</i>
<i>2</i>	Atmospheric pressure: Horizontal and vertical distribution, factors affecting their distribution, characteristics of isobar; Pressure belts and winds: Types of winds, air masses and atmospheric disturbances; Cyclone: Temperate and tropical; Anti-cyclone; Atmospheric moisture: Processes of evaporation, condensation and precipitation; Relative and absolute humidity; Forms of condensation: Cloud, fog, dew and frost; Forms of precipitation: Snow, hail and rain; Types of rainfall: Conventional, orographic and cyclonic.	
<i>3</i>	Factors affecting India's climate: Latitudinal extent, distance from the sea, northern mountain ranges, physiography, monsoon winds, upper air circulation, western disturbances and tropical cyclones, southern oscillation, El Nino; Understanding the concept and mechanism of monsoon; Break in monsoon; Retreat of the monsoon; Seasons of India; Loo; Kalbaisakhi.	

# IDC - Climatology - Study materials 2nd Semester.

ବାୟୁମନ୍ତଳର ଖର୍ଚ୍ଚ :- ତିନି ଉପାଦାନ ମିଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚିତ -

- ସଂସ୍ଥା :-
- (i) ଉତ୍ତମୋଷ ଉପାଦାନ ।
  - (ii) ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ।
  - (iii) ଅନ୍ତରାକାଶ ।

1. ଉତ୍ତମୋଷ ଉପାଦାନ :- (i) ନାଉଟ୍ରୋଜେନ (78.08%),  
 (ii) ଅକ୍ସିଜେନ (20.94%), (iii) କାର୍ବନଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ (0.042%),  
 (iv) ଅନ୍ତରାକାଶ (0.03%), (v) ନିୟନ (0.0018%), (vi) ହିଲିୟମ 0.0005%,  
 (vii) କ୍ରିପ୍ଟନ୍ 0.00001, (viii) ଅର୍ଗନ୍ 0.000055%, (ix) ଫ୍ଲୋରୋଇନ୍, (x) ହେଲିୟମ ଇତ୍ୟାଦି।
2. ବାୟୁମନ୍ତଳେ କାର୍ବନଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଅନ୍ତରାକାଶରେ ପରିମାଣ ବାହୁ ଗୋଲେ ପୃଥିବୀରେ ବିଶ୍ୱ ହିଲିୟମ ଦେଖା ଦିଅ ।
3. ବାୟୁମନ୍ତଳେ ଅନ୍ତରାକାଶ ଉତ୍ତମୋଷ ପରିମାଣ = 0.03% ଏହି ନିସ୍କ୍ରିୟ ଉତ୍ତମ ହିଲିୟମ ପରିଚିତ ।
4. ବାୟୁ ମନ୍ତଳେ ଅର୍ଗନ୍ ଉତ୍ତମୋଷ ପରିମାଣ ବାୟୁମନ୍ତଳେ ପୁର୍ବ ନ୍ୟାନ୍ 0.000055%.
5. ବାୟୁ ମନ୍ତଳେ ହିଲିୟମ ଉତ୍ତମୋଷ ପରିମାଣ ଓ ପୁର୍ବ ନ୍ୟାନ୍ 0.0005%.

## 2. জলীয় বাষ্প :-

(i) বায়ু মনুলে জলীয় বাষ্পের গড় পরিমাণ 0.26 থেকে 4.5 %

(ii) হৃ পৃষ্ঠ থেকে মাঝে মাঝে 10 কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত জলীয় বাষ্প দেখা যায়।

(iii) এর মধ্যে 5 কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত জলীয় বাষ্পের 90% অধ্যয়ন করে।

## 3. অ্যারোসল বা বায়বীয় কণা :-

□ বায়ুমনুলে ভাসমান অসংখ্য খাড়া অতি ক্ষুদ্র কণাগুলির ধর্মী শূন্য কণাগুলিকে একত্রে অ্যারোসল বলে।

বিভিষ্ট :-

□ (i) Aerosol - এর অর্থাৎ গড় ব্যাস 100 মাইক্রোমিটার।

(ii) Aerosol - এর গুলি বায়ুমনুলে জলাকণা বা কণাগুলি কণা কণা করে।

বায়ুমণ্ডলের স্তর গুলি :-

□ বায়ু মণ্ডলকে মণ্ডলের স্তর গুলি নামে প্রািনত দুটি ভাবে কয় হতে পারে। বায়ুমণ্ডলকে দুটি স্তর অনুসারে এতে ভিন্নতার তারতম্য অনুসারে।

● বায়ুমণ্ডলিক স্তর অনুসারে বায়ুমণ্ডলকে দুটি স্তরে ভাগ করা যায়। যথা :-

① সমস্তমণ্ডল , ② বিস্তৃতমণ্ডল।

① সমস্তমণ্ডল (Homosphere) :-

□ সমস্তমণ্ডল থেকে প্রায় ১০ থেকে ১০০ কিমি উচ্চতা পর্যন্ত বায়ুমণ্ডল স্তরকারি বিভিন্ন উদ্ভিদ-শুলি অনুপাত মটামুটি একই থাকে। তার এই স্তরটিকে নাম সমস্তমণ্ডল।

② বিস্তৃতমণ্ডল :-

□ বায়ু মণ্ডলে উপরে অর্থাৎ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে হোটেমুটি ১০ থেকে ১০০ কিলোমিটার পিঠ থেকে বায়ুমণ্ডলের স্রম সীমা প্রায় ১০০০০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত স্তরটিকে বিস্তৃতমণ্ডল বলে।

□ উচ্চতার ভিত্তিতে স্রামের উপাদানের তারতম্য ভিত্তিতে এই স্তরটিকে চারটি উপস্তরে ভাগ করা হয়েছে যেন-

- i) আনবিক শহীজোনে স্তর - ১০ থেকে ২০০ কিলোমিটার উচ্চতা
- ii) পাঠমানবিক অস্ত্রোনে স্তর - পৃষ্ঠ থেকে ২০০ থেকে ১,১০০ কিমি পর্যন্ত।
- iii) হিলিয়াম স্তর - পৃষ্ঠ থেকে ১,১০০ থেকে ৩,৫০০ কিমি
- iv) আনবিক শহীজোনে স্তর - হিলিয়াম স্তরের ওপর ৩,৫০০ থেকে ১০,০০০ কিমি।



vii) বায়ুমণ্ডলের অর্ধস্থিত সমস্ত স্রাব্য পদার্থের 75% ট্রোপোস্ফিয়ারে থাকে এবং ধূলিকণা জলীয় কণিকা এবং অন্যান্য উপাদানগুলি 99% এই ট্রোপোস্ফিয়ারে পাওয়া যায়।

viii) ~~ট্রোপোস্ফিয়ার~~ ট্রোপোস্ফিয়ারে যথানে কোন বাতাসের ট্রোপোস্ফিয়ারে বৃষ্টিপাত হয়।

স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার :-

i) ট্রোপোস্ফিয়ারের ওপরে অবস্থিত ট্রোপোস্ফিয়ারের পর 50 km উচ্চতা পর্যন্ত মোটামুটিভাবে স্থিতিশীল বায়ুমণ্ডলের দ্বিতীয় স্তরের নাম স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার।

ii) বায়ুমণ্ডলে এই স্তরে উচ্চতর তাপের সাথে সাথে উষ্ণতা ক্রমাগত হ্রাস পায়। এতে তাপের তাপমাত্রা 5 km উচ্চতায় স্থিত  $0^{\circ}\text{C}$  পৌঁছায়।

iii) বায়ুমণ্ডলে 15-30 km উচ্চতায় সূর্য থেকে আসা অতিবেগুনীয় রশ্মি লক্ষ্য করা যায়।

iv) স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে বায়ু পাতলা, স্বচ্ছ ও স্বচ্ছ আওয়াওয়া মিশ্রণে কোনো ধূলা বা কণিকার এই স্তরে নীচে দিকে মিশ্রণ হয় দেখা যায়।

v) বৃষ্টি পাত, বা কল্যা মাঘ ইত্যাদি না থাকায়  
এই প্রকার মানুষ মনুল রলা হয়। এই কারণে  
এই প্রকার হুটে মেনমুলি লোলেল বাবে।

vi) ক্রোমোসম ক্রোমোসোমের উৎপত্তি  
অন্যভাবে এর উচ্চতা প্রায় 50  $\mu\text{m}$  পর্যন্ত এর  
কি ক্রোমোসম এ বায়ু তাপমাত্রা  $0^\circ\text{C}$  সীমায়  
পৌঁছায়।

ম্যোমোসম :-

i) এই ক্রোমোসম এর উচ্চতা থেকে ম্যোমোসম ক্রোমোসম  
এই প্রকার বিস্তার হুটের মত উচ্চতা 50-80 মিমি  
পর্যন্ত।

ii) এই প্রকার তাপমাত্রা ব্রহ্মণ ক্রমাতে উচ্চতা 80 মিমি  
উচ্চতা -  $85^\circ\text{C}$  হয়।

iii) এই প্রকার বায়ু তাপ কম থাকে 50 থেকে 80 মিমি  
মাত্র বায়ু তাপ 1 mm থেকে কম 0.01 মিলিটারে পৌঁছায়।

iv) অত্যন্ত মীতল হওয়ার কারণে ম্যোমোসম থেকে যা  
কম উৎপাদিত হয় তাই দিকে হুটে তাপ মেনমুলি ম্যোমোসম  
প্রকার হুটে 100 বায়ু তাপে 100 মিমি পুরে হুটে হয়  
হয়।

v) ম্যোমোসমের মত মত হওয়ার উচ্চতা হুটে  
হয় মত হুটে হুটে হুটে হুটে ম্যোমোসম হলে।





:- ଜଳବାୟୁ ବିଜ୍ଞାନ :-

Absorption: ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ନୀଚେ ଦିଆ ଶୁଷ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ  $CO_2$ , ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ, ହିଲିଜିଆ ପ୍ରଭୃତି ଆଦିର ସୂର୍ଯ୍ୟରଶ୍ମିର ଶକ୍ତିକୁ ଶୋଷଣ କରି ପ୍ରାୟ 19% ତାପ ଗ୍ରହଣ କରେ।

□ ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠ ଯାହା ପ୍ରାୟ 2km ଶ୍ଚିତା ମଧ୍ୟେ ଉଚ୍ଚ ଯାହା ପ୍ରାୟ 50% ଗୋଷିତ ଶକ୍ତି ଅବଶୋଷଣ କରେ ଯେଉଁଠି ବାୟୁ ମଣ୍ଡଳର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ।

1. ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ତାପର ଆନୁଦୃଶିକ ବର୍ତ୍ତନର କାରଣଗୁଡ଼ିକ

- (i) ଅକ୍ଷରାଜ, (ii) ଅନୁଦୃଶିକ ବର୍ତ୍ତନର ବିଭିନ୍ନ,
- (iii) ବାୟୁ ପ୍ରସାର (iv) ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠର ପ୍ରସାର, (v) ନିର୍ଗତ ଅବଶୋଷଣ
- (vi) ଶିଳା ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରଭୃତି, (vii) ବାୟୁ ମଣ୍ଡଳର ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ନିର୍ଗମନ, (viii) ଚନ୍ଦ୍ରର ଅବଶୋଷଣ।

2. ଶୁଷ୍କ ଯାହା ତାପର ଆନୁଦୃଶିକ ବର୍ତ୍ତନର କାରଣଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣରୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ତାପ ଗ୍ରହଣ କରେ ହେବେ:-

→ ତିନିଟି କାରଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ତାପ ଗ୍ରହଣ କରେ ହେବେ ହେବେ:-

(i) ତ୍ରୀକ୍ଷିପ୍ତ ମଣ୍ଡଳ (Tropid zone)

ଏହି ଅକ୍ଷରାଜ ପ୍ରାୟ 0° - 23 1/2° ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଅକ୍ଷରାଜ ମଧ୍ୟେ ଶିଖାରେ।

ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯାହା ତାପ ଗ୍ରହଣ 27°C ସମସ୍ତାଂଶେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଯୁକ୍ତି ଶ୍ଚିତା ବା ତ୍ରୀକ୍ଷିପ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ଯାହା।

## ii) নাতিশীতোষ্ণ মনুল :-

i) উত্তর গোলার্ধে এত দক্ষিণ: গোলার্ধে  $23\frac{1}{2}^{\circ}$  ও  $0^{\circ}$  এর মাঝে অবস্থিত স্থান ( $23\frac{1}{2}^{\circ}$  থেকে  $45^{\circ}$  থেকে  $66\frac{1}{2}^{\circ}$ ) সুস্থিছে।

ii)  $23\frac{1}{2}^{\circ}$  (থেকে  $45^{\circ}$  অক্ষাংশ) এর মাঝে এই মনুলের যে অঞ্চল স্থি মনুলে নিজেই অবস্থিত আছে সেই নাতিশীতোষ্ণ মনুল বলে।

iii) আরও যে অঞ্চল থেকে হওয়া নিজেই অবস্থিত ( $45^{\circ}$  থেকে  $66\frac{1}{2}^{\circ}$  অক্ষাংশ) আছে সীতল নাতিশীতোষ্ণ মনুল বলে।

## iii) Frigid zone স্থি মনুল ?

i)  $66\frac{1}{2}^{\circ}$  অক্ষাংশ থেকে  $90^{\circ}$  ও  $90^{\circ}$  পর্যন্ত অক্ষাংশ পর্যন্ত স্থান সুস্থিছে স্থি মনুল বলে।  
এই অঞ্চলের সর্বমাত্রা সর্বোচ্চত  $0^{\circ}\text{C}$  এর তার নিচে থাকে।

## ক. catabatic (ফ্রিগিড) (স্থি) :-

□ পার্বত অঞ্চলে স্থি মনুলে বার্ষিকে তাপ বিচ্ছিন্ন হয় বলে পার্বতের ঊর্ধ্বে তাপের তাপ অতিরিক্ত সীতল হয়। তাই এই পার্বতের গায়ে বেশ খীয়ে খীয়ে স্থি মনুলে স্থি মনুলে তাপ হলে ফ্রিগিড স্থি মনুল বলে স্থি মনুলে স্থি মনুলে।

1. Insolation আন্তর্বিজ্ঞান:  $\frac{\text{কিরণিত}}{\text{কিরণিত}}$   
 পৃথিবীতে আন্তর্বিজ্ঞান  $\frac{\text{কিরণিত}}{\text{কিরণিত}}$   $\frac{\text{কিরণিত}}{\text{কিরণিত}}$   $\frac{\text{কিরণিত}}{\text{কিরণিত}}$   
 Solar Radiation কে Insolation বলে।  
 ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের এই সূর্যের আলোক জ্যে  
 হ্রাসে নিম্নিত হয় কারণে অতি দূরত্বের  
 (29,7000 -  $\frac{\text{km}}{\text{মিনিট}}$   $\frac{1}{1.86000 \text{ mile}}$ ) ক্ষুদ্র  
 তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ ধ্রুপে বা আলোক তরঙ্গ  
 ধ্রুপে পৃথিবীতে পৌঁছায় সেটাকে Insolation  
 বলে।

আন্তর্বিজ্ঞান অপেক্ষাকৃত  
 ক্রান্তিতে হওয়ায় এতে সূর্যকিরণ অপেক্ষা  
 দলতলে।

আন্তর্বিজ্ঞান 200 কোটি বছর  
 এক করা পৃথিবীতে আসে।

Insolation - এর নিম্নলিখতগুলি হল -

- (i) সূর্যকিরণের দিকের কোণের পরিমাণ।
- (ii) সূর্যালোকের আয়তন বা দিনের দৈর্ঘ্য।
- (iii) সূর্যের পৃথিবীর মাঝে দূরত্ব।
- (iv) পরিষ্কারতা।
- (v) আবহমানের প্রভাব।







■ সমচাপ বেধের বৈশিষ্ট্য :-

- i) সমচাপ বেধে মানচিত্র প্রায় সমান্তর বেধের সমান্তরাল অঙ্কন করে।
- ii) সমচাপ বেধে চক্রাকার হলে তাকে cell বা কোষ বলে।
- iii) দীর্ঘায়ু নিম্নচাপ অঞ্চল হল Trough বা হ্রাসবলু।
- iv) কোনোখানে নিম্নচাপ বা উচ্চ সৃষ্টি হলে সেখানে সমচাপ বেধে সুনির্ভর বৃত্তাকারে অঙ্কন করে।
- v) দীর্ঘায়ু উচ্চচাপ অঞ্চল হলে Ridge বা গর্ভি বলে।
- vi) সমচাপ বেধে সুনির্ভর দূরে দূরে অঙ্কন করলে মানচিত্র আঁকবার পরিচয় তখন করে এর ক্ষেত্রাদি অঙ্কন করলে দূর্যোগদূর আঁকবার পরিচয় তখন করে।
- vii) অসংখ্য সমচাপ বেধে এক সর্পে চক্রাকারে থাকলে এর সৃষ্টি সমুদ্রনাথ।

■ তাম্বুর চাপের তাল :-

এক্ষেত্রে একটি আনুভূমিক তলে অবস্থিত ৫টি আনুভূমিক মণ্ডি তাম্বুর চাপের পরিচয়ের হারে সর্পাকারে তাম্বুর চাপের তাল বলে।

- (i) উচ্চচাপ
- (ii) উচ্চচাপ
- (iii) উচ্চচাপ
- (iv) উচ্চচাপ
- (v) উচ্চচাপ



ନିମ୍ନ ଚ୍ୟୁତ :-

ପୃଥିବୀର ଧ୍ୟାୟୀ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଓ ଏହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଚ୍ୟୁତ  
ହୁଏ ଯେଉଁଠି ସମାନତାରେ ଏହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଦିଗେ ପ୍ରାୟ ଏହା  
ସାଥୀତ ସାମାନ୍ୟତା ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଚ୍ୟୁତ ଏ ଚ୍ୟୁତ  
ଅନୁଗତ ହୁଏ ଏହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଚ୍ୟୁତ ରେ । ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଚ୍ୟୁତ  
ତିନି ପ୍ରକାର -

- (i) ଆମ୍ବନ ଚ୍ୟୁତ
- (ii) ଯେକାନ୍ତ ଚ୍ୟୁତ
- (iii) ପାଞ୍ଚିତ ଚ୍ୟୁତ ।



## জান্নীয় বায়ু :-

৬- প্রকৃতি, সৃষ্টিজর ওয় শ্রম স্রমত ইতিাদি জান্নীয় জারনে বায়ু স্রিত ও জাপর তরতমের জলে য় বায়ু স্রমতর উপজি হয় তেজ জান্নীয় বায়ু লয় হয়।

উষ্ণ জান্নীয় বায়ু :- চিনুক ~~স্রম~~ জল (অল্প পরত উত্তর জলে স্রমতর হয়) চিনুক

① চিনুক (উত্তর আমেরা রজি পরত মালায় উত্তর পূর্বে জলে স্রমতর হয়, স্রিমুষ্ণ, হুমার স্রমতর বলা হয়।

② লু (উত্তর দক্ষিণ অরতে স্রিমাজলে স্রমতর হয়)

③ মিরকো → (ইরালি স্রমতর ওলাজয় বায়ু স্রমতর হয়) (দক্ষিণ আমেরা স্রমতর, স্রিমুষ্ণ, হুমার স্রমতর দক্ষিণ)

④ হামাটোন (ইরালি স্রমতর ওলাজয় স্রমতর হয়।

## শীতল জান্নীয় বায়ু :-

① জলবিহারা (দক্ষিণ অরতে আমেরা বর্ধিচিয়া)

② মিস্রীল (স্রমতর স্রমতর স্রমতর স্রমতর স্রমতর হয়)

③ সেরা (ইরালি স্রমতর ওলাজয় স্রমতর হয়)

আকস্মিক বায়ু :-

বায়ু মনুলে হঠাৎ গোল আকারে সৃষ্টি করে  
দূরত্ব পূর্ণ অনিয়মিত বায়ু প্রবাহকে আকস্মিক  
বায়ু বলে।

আকস্মিক বায়ু ঘূর্ণ বায়ু ১) ঘূর্ণ বায়ু ২)

১) প্রতীপ ঘূর্ণগত।

ঘূর্ণগতের কেন্দ্রে বায়ু গোল মার্কে কেন্দ্রে গঠিত  
মার্কে বেগ। এই কেন্দ্রে গোল ৪৫০-১০০ মিলিমিটার  
থেকে ২০০০।

ঘূর্ণগতের দক্ষিণাংশের একটি গোলমতের কেন্দ্রে  
থাকে বায়ু ঘূর্ণগতের কেন্দ্রে থাকা হয়।

অন্যান্য জিওমেট্রিক ঘূর্ণগত দুই প্রকার :-

১) ক্রান্তীয় ঘূর্ণগত বা উষ্ণমণ্ডলীয় ঘূর্ণগত

২) নাতিশীতোষ্ণ ঘূর্ণগত।

১) ক্রান্তীয় ঘূর্ণগত :-

নিষ্করণের দক্ষিণে ক্রান্তীয় মনুলে ১০-২০  
অক্ষরেখার মধ্যে মনুলে উপর সূর্যে নিষ্করণের কেন্দ্রে  
কেন্দ্রে সূর্যে ঘূর্ণগতের ক্রান্তীয় বা উষ্ণমণ্ডলীয় ঘূর্ণগত  
বলে। ঘূর্ণগত বিভিন্ন আকারে বিভিন্ন নাম  
প্রাপ্ত।

- ক্রান্তীয় মনুলে ক্রান্তীয় ঘূর্ণগত।
- দক্ষিণ চিন মনুলে গঠিত।

- ଜାପାନ ସାଗରରେ ଉତ୍ପତ୍ତି
- ଓଡ଼ିଶା ଲୋଡ଼ ସାଗରରେ ସାବୁରି
- ଦକ୍ଷିଣ ଲୋଡ଼ ସାଗରରେ ଡିଲି ଡିଲି ।
- ଦକ୍ଷିଣ-ପାକିଷ୍ଟାନ ଲୋଡ଼ ସାଗରରେ ମାହିଜ୍ଞାନ
- ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳରେ ମାହିଜ୍ଞାନ
- ପାକିଷ୍ଟାନ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ନେସୋ ।

ଭାରତୀୟ ମହାସାଗର  
 5°-30° ଉତ୍ତରୀୟ ଧ୍ରୁବରେ ଉପସ୍ଥାନ

(i) 100-500 km ଉପସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥାନ । ଉପସ୍ଥାନ ଉପରେ ଉପସ୍ଥାନ ଧ୍ରୁବରେ ଉପସ୍ଥାନ ଧ୍ରୁବରେ । ଉପସ୍ଥାନ ଉପରେ ଉପସ୍ଥାନ ଧ୍ରୁବରେ ।

(ii) ଉପସ୍ଥାନ ଉପରେ ଉପସ୍ଥାନ 30°-60° ଉପସ୍ଥାନ ଉପରେ ଉପସ୍ଥାନ ଧ୍ରୁବରେ ।

(iii) ଉପସ୍ଥାନ ଉପରେ ଉପସ୍ଥାନ 30-35 km ଉପସ୍ଥାନ ଉପରେ ଉପସ୍ଥାନ ଧ୍ରୁବରେ ।

(iv) ଉପସ୍ଥାନ ଉପରେ ଉପସ୍ଥାନ ଉପସ୍ଥାନ ଉପରେ ଉପସ୍ଥାନ ଧ୍ରୁବରେ । ଉପସ୍ଥାନ ଉପରେ ଉପସ୍ଥାନ ଧ୍ରୁବରେ । ଉପସ୍ଥାନ ଉପରେ ଉପସ୍ଥାନ ଧ୍ରୁବରେ ।

ଆମ୍ବୁ  
ଓନ୍ଦତା :-

ଏକା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟତନର ଆମ୍ବୁତେ ସିଦ୍ଧିତ କୃତ୍ୟାମୟର ପାଠ୍ୟମାନର ଉପ ଆମ୍ବୁତେ ଓନ୍ଦତା

କେମ ଓନ୍ଦତା :-

ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷମିତ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଠ୍ୟମାନ ଆମ୍ବୁତେ ଏକ ପାଠ୍ୟମାନ କୃତ୍ୟାମୟର ଆମ୍ବୁତେ ଆମ୍ବୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେମ ଓନ୍ଦତା ରହେ । କେମ ଓନ୍ଦତା ଆମ୍ବୁ/କ୍ଷମିତ୍ୟମାନର

ଆମ୍ବୁକ୍ଷିତ ଓନ୍ଦତା :-

କେମ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷମିତ୍ୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟତନର ଆମ୍ବୁତେ ଏକ ସିଦ୍ଧିତ କୃତ୍ୟାମୟର ପାଠ୍ୟମାନ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷମିତ୍ୟ ଏକ ଆୟତନର ଆମ୍ବୁ ମାର୍ଗଦିକ୍ଷିତ ଏକ ପାଠ୍ୟମାନ ଆମ୍ବୁ କୃତ୍ୟାମୟର ମାନ ଉପରେ ଆମ୍ବୁତେ ଓନ୍ଦତା ଆମ୍ବୁକ୍ଷିତ ଓନ୍ଦତା ରହେ ।

ଆମ୍ବୁକ୍ଷିତ ଓନ୍ଦତା ଆୟତନ (ଏକକ) କ୍ଷମିତ୍ୟ ଉପରେ ହୁଏ ।

ଆମ୍ବୁକ୍ଷିତ ଓନ୍ଦତା ମାର୍ଗଦିକ୍ଷିତ କେମ ଏକ କ୍ଷମିତ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ହୁଏ ।

କ୍ଷମିତ୍ୟ ଓ ଆମ୍ବୁକ୍ଷିତ ଓନ୍ଦତାର ମାର୍ଗଦିକ୍ଷିତ :-

- ① କ୍ଷମିତ୍ୟ ଆୟତନ ଆମ୍ବୁ କୃତ୍ୟାମୟର ମାନ ଉପରେ ଆମ୍ବୁକ୍ଷିତ ଓନ୍ଦତା ହୁଏ ।

11) উষ্ণতা জমাল বায়ুও কলীপ রক্ষা - ধারণ করে  
 জমাতে করে মূল আর্দ্রতার আদত রাখে।

আর্দ্রতার আদত =  $\frac{\text{নির্দিষ্ট উষ্ণতায় নির্দিষ্ট আর্দ্রতন বায়ুতে  
 রাখা জীববায়ু}}{\text{ঐ উষ্ণতায় ঐ আর্দ্রতন সমস্ত  
 বায়ুতে রাখা জীববায়ু}} \times 100$

• আর্দ্রতার আদত মাপা হয় হাইগ্রোমিটার যন্ত্রে।  
 সাধারণ এই যন্ত্রে মুষ্টি ফুটু এত আদত ফুটু।

ব্রিটিশ বিজ্ঞানী রবার্ট হুক (1833 খ্রিঃ)  
 প্রথম 'মাসুমি' বা monsoon শব্দ প্রয়োগ  
 করে।

মাসুমি  
 এই শব্দ মূলত মাসিম (monsoon) বা মাসিমাল  
 মাসিমাল (monsoon) শব্দ থেকে এসেছে  
 মূল থেকে।

মাসিমাল মাসিমাল মাসিমাল মাসিমাল  
 মাসিমাল মাসিমাল মাসিমাল মাসিমাল

মাসিমাল মাসিমাল - মাসিমাল



বালুবিধ বহু দিগে মুক্ত হয় তাহা হইলে  
তাহা বা হ্রাসপ্রাপ্ত বহু হয়।

ক) ক্রান্তীয় মুনোবাতের অধিকার  $30^{\circ}$  -  $35^{\circ}$  অক্ষাংশে  
অবস্থিত।  
স্রাবের পরিমাণ  $100 - 800 \text{ km}$  লম্বা / সমুদ্রে স্রাব

ক) বালুবিধ :-

$30^{\circ}$  -  $60^{\circ}$  উত্তর ও দক্ষিণ / দ্রাঘিমাংশে ২৫।  
স্রাবের পরিমাণ  $30 - 80 \text{ km}$   
এই মুনোবাত বিক্ষিপ্ত। চরিত্রে বহু / স্বর্গীয় স্রাব ও  
সুমার স্রাব মুক্ত।

ক) প্রধান বায়ু আন্তঃস্থিত  $100\%$  হয় তখন তাহা  
অসম্প্রসৃত বা স্রাবসম্পন্ন বায়ু বলা হয়।  
অসম্প্রসৃত বায়ু :-

বিদ্যমান জল-চক্রের বিদ্যমান  
আবেগের বায়ু স্রাবের স্রাব হ্রাসের মাঝে  
মাত্র স্রাবের মাঝে স্রাবের  $0 - 1$  বলে।

সিকিরাধু :-

যে উচ্চতায় অসম্প্রসৃত বায়ু স্রাবের মাঝে  
স্রাবের স্রাব তাহা সিকিরাধু বলে।  
এই সিকিরাধু বিদ্যে বিদ্যে স্রাবের স্রাব  
স্রাবের স্রাব ২৫।

\* আইনজিটার মধ্যে স্থাপত্য স্থাপত্য আন্দোলন  
 সনিকায় করা হয়। আন্দোলন কৃত ও কৃত কৃত

\* কৃত কৃত ও আন্দোলন কৃত আইনজিটার  
 আইনজিটার কাছে সনিকায়।

সনিকায়

যে সনিকায় জালিয়া সনিকায়  
 সনিকায় সনিকায় সনিকায় সনিকায়  
 সনিকায় সনিকায় সনিকায় সনিকায়  
 সনিকায় সনিকায় সনিকায় সনিকায়

আইনজিটার

আইনজিটার জালিয়া সনিকায়  
 সনিকায় সনিকায় সনিকায় সনিকায়  
 সনিকায় সনিকায় সনিকায় সনিকায়  
 সনিকায় সনিকায় সনিকায় সনিকায়

সনিকায় - সনিকায়, সনিকায়, সনিকায়, সনিকায়  
 সনিকায়।

সনিকায়!

সনিকায় সনিকায় সনিকায় সনিকায়  
 0.5 সনিকায় সনিকায় সনিকায় সনিকায়  
 সনিকায় সনিকায় সনিকায় সনিকায়  
 সনিকায় সনিকায় সনিকায় সনিকায়

বুধি সাত তিব স্রাব - ১ অধিচলন,  
~~কৈলোক~~ কৈলোক বুধি সাত, দুলাব  
বুধি সাত। বেপ সজ