



‘সমানো মন্ত্র: সমিতি: সমানী’

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL

B.Sc. Minor/Dsc 1st Semester Examination, 2024

MATHMIN101/MATHDSC101-MATHEMATICS

CLASSICAL ALGEBRA AND MATRIX THEORY

Time Allotted: 2 Hours 30 Minutes

Full Marks: 60

The figures in the margin indicate full marks.

GROUP-A / বিভাগ-ক / বিভাগ-ক

1. Answer any **four** questions:

3×4 = 12

যে-কোন চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও:

কোন চার প্রশ্নের উত্তর দেও:

(a) Find the remainder when $2x^4 - 6x^3 + 7x^2 - 5x + 1$ is divided by $(2x - 3)$.

3

$2x^4 - 6x^3 + 7x^2 - 5x + 1$ -কে $(2x - 3)$ দিয়ে ভাগ করলে যে ভাগশেষ হয় তা নির্ণয় কর।

$2x^4 - 6x^3 + 7x^2 - 5x + 1$ লাই $(2x - 3)$ লে ভাগ গর্দা শেষ পত্তা লগাউ।

(b) Find the rank of the matrix

3

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{pmatrix} \text{ ম্যাট্রিক্সটির rank নির্ণয় কর।}$$

$$\text{আব্বুহ } \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{pmatrix} \text{ কো rank পত্তা লগাউ।}$$

(c) Show that the equations $x + y + z = 9$ and $3x - 2y + 4z = 3$ are consistent.

3

দেখাও যে $x + y + z = 9$ এবং $3x - 2y + 4z = 3$ সমীকরণদ্বয় সামঞ্জস্যপূর্ণ (consistent).

সমীকরণহরু $x + y + z = 9$ অনি $3x - 2y + 4z = 3$ সঙ্গতি চন্ ধনী দেখাউ।

(d) Solve the equation $x^4 + x^2 - 2x + 6 = 0$, it is given that $(1 + i)$ is a root.

3

$x^4 + x^2 - 2x + 6 = 0$ সমীকরণটিকে সমাধান কর, যেখানে প্রদত্ত আছে $(1 + i)$ ইহার একটি বীজ।

সমীকরণ $x^4 + x^2 - 2x + 6 = 0$ কো দিইएको এক মূল $(1 + i)$ মএ यसलाई समाधान गर।

(e) Verify Cayley-Hamilton theorem for the matrix $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix}$.

3

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix} \text{ ম্যাট্রিক্সটির ক্ষেত্রে Cayley-Hamilton উপপাদ্যটি যাচাই কর।}$$

$$\text{আব্বুহ } \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix} \text{ কো লাগি Cayley-Hamilton প্রমেয় প্রমাণিত गर।}$$

(f) If a, b, x are real and $\text{mod}(a+ib) = 1$ prove that $(a+ib)^{ix}$ is purely real. 3

যদি a, b, x সকলে বাস্তব এবং $\text{mod}(a+ib) = 1$ হয় তবে প্রমাণ কর $(a+ib)^{ix}$ একটি সম্পূর্ণ বাস্তব (purely real).

যদি a, b, x বাস্তবিক অনি $\text{mod}(a+ib) = 1$ হ'লে $(a+ib)^{ix}$ বিশুদ্ধ বাস্তবিক (purely real) হ'লে প্রমাণ কর।

GROUP-B / বিভাগ-খ / বিভাগ-খ

2. Answer any **four** questions:

6×4 = 24

যে-কোন চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও:

কোন চার প্রশ্নের উত্তর দেও:

(a) If $\log \sin(\theta + i\phi) = \alpha + i\beta$ then prove that $2\cos 2\theta = e^{2\phi} + e^{-2\phi} - 4e^{2\alpha}$ and $\cos(\theta - \beta) = e^{2\phi} \cos(\theta + \beta)$. 6

যদি $\log \sin(\theta + i\phi) = \alpha + i\beta$ হয় তবে প্রমাণ কর $2\cos 2\theta = e^{2\phi} + e^{-2\phi} - 4e^{2\alpha}$ এবং $\cos(\theta - \beta) = e^{2\phi} \cos(\theta + \beta)$.

যদি $\log \sin(\theta + i\phi) = \alpha + i\beta$ হ'লে প্রমাণ কর $2\cos 2\theta = e^{2\phi} + e^{-2\phi} - 4e^{2\alpha}$ অনি $\cos(\theta - \beta) = e^{2\phi} \cos(\theta + \beta)$.

(b) If x, y, z are positive real numbers and $x + y + z = 1$, prove that 6

যদি x, y, z সকলেই ধনাত্মক বাস্তব সংখ্যা এবং $x + y + z = 1$ হয় তবে প্রমাণ কর

যদি x, y, z ধনাত্মক বাস্তবিক সংখ্যা হ'লে $x + y + z = 1$ হ'লে প্রমাণ কর

$$8xyz \leq (1-x)(1-y)(1-z) \leq \frac{8}{27}$$

(c) Find the range of values of k for which the equation $x^4 - 26x^2 + 48x - k = 0$ has four unequal roots. 6

k -এর মানের বিস্তার নির্ণয় কর যার জন্য $x^4 - 26x^2 + 48x - k = 0$ সমীকরণটির চারটি বীজই অসমান।

সমীকরণ $x^4 - 26x^2 + 48x - k = 0$ কো চারটি অসমান মূল হ'লে k কো মান হ'লে দায়রা পত্তা লাগে।

(d) Obtain the fully reduced normal form of the matrix 6

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 0 & 3 \\ 2 & 6 & 4 & 2 & 8 \\ 3 & 9 & 4 & 2 & 10 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 0 & 3 \\ 2 & 6 & 4 & 2 & 8 \\ 3 & 9 & 4 & 2 & 10 \end{bmatrix}$$

ম্যাট্রিক্সটির সম্পূর্ণ হ্রাস স্বাভাবিক রূপটি (fully reduced normal form) নির্ণয় কর।

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 0 & 3 \\ 2 & 6 & 4 & 2 & 8 \\ 3 & 9 & 4 & 2 & 10 \end{bmatrix}$$

আব্রূহ $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 0 & 3 \\ 2 & 6 & 4 & 2 & 8 \\ 3 & 9 & 4 & 2 & 10 \end{bmatrix}$ কো পূর্ণ রূপমা ঘটা হ'লে সাধারণ রূপ (fully reduced normal form) প্রাপ্ত

হ'লে।

(e) Solve by Cardon's method $x^3 - 12x + 65 = 0$. 6

$x^3 - 12x + 65 = 0$ সমীকরণটিকে Cardon পদ্ধতিতে সমাধান কর।

Cardon কো পদ্ধতিদ্বারা সমাধান কর: $x^3 - 12x + 65 = 0$

- (f) Find the inverse of the matrix $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ by using elementary row operations. 6

প্রাথমিক সারি অপারেশন (elementary row operation)-এর সাহায্যে $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ ম্যাট্রিক্সটির

বিপরীত (inverse) ম্যাট্রিক্সটি নির্ণয় কর।

প্রাথমিক পঙ্ক্তি সন্মালনকো সহায়তালে $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ কো inverse পত্তা লগাউ।

GROUP-C / বিভাগ-গ / বিভাগ-গ

Answer any two questions

12×2 = 24

যে-কোন দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও

কোন দুই প্রশ্নের উত্তর দেও

3. (a) Solve the equation $x^4 + 3x^3 + x^2 - 2 = 0$ by Ferrari's method. 6

Ferrari পদ্ধতিতে $x^4 + 3x^3 + x^2 - 2 = 0$ সমীকরণটিকে সমাধান কর।

Ferrari কো বিধি লে সমীকরণ $x^4 + 3x^3 + x^2 - 2 = 0$ লাই সমাধান কর।

- (b) If $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ are n -distinct roots of the equation $x^n - 1 = 0$, then prove that 6

$$(a + b\alpha_1)(a + b\alpha_2) \dots (a + b\alpha_n) = a^n + (-1)^{n-1}b^n$$

যদি $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$; $x^n - 1 = 0$ সমীকরণটির n সংখ্যক স্বতন্ত্র বীজ হয় তাহলে প্রমাণ কর

$$(a + b\alpha_1)(a + b\alpha_2) \dots (a + b\alpha_n) = a^n + (-1)^{n-1}b^n$$

যদি $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ সমীকরণ $x^n - 1 = 0$ কো n -অলাগ মূলহরু ধরে, প্রমাণ কর

$$(a + b\alpha_1)(a + b\alpha_2) \dots (a + b\alpha_n) = a^n + (-1)^{n-1}b^n$$

4. (a) Determine the conditions of a and b for which the system 6

$$x + y + z = 1$$

$$x + 2y - z = b$$

$$5x + 7y + az = b^2$$

admits of (i) only one solution.

(ii) no solution.

(iii) many solutions.

$$x + y + z = 1$$

$$x + 2y - z = b$$

$$5x + 7y + az = b^2$$

সিস্টেমটির (i) শুধুমাত্র একটি সমাধান আছে

(ii) কোন সমাধান নেই

(iii) একাধিক সমাধান আছে।

এমন a এবং b -এর মানগুলি নির্ণয় কর।

a অনি b কো সর্বত্রক নির্ধারণ কর জসকো লাগি সমীকরণ সমূহ

$$x + y + z = 1$$

$$x + 2y - z = b$$

$$5x + 7y + az = b^2$$

- को (i) एकमात्र समाधान हुन्छ
(ii) समाधान नै हुँदैन
(iii) एकभन्दा बढी समाधान हुन्छ।

(b) If $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

4+2

then show that for every integer $n (\geq 3)$, $A^n = A^{n-2} + A^2 - I$. Hence evaluate A^{50} .

यदि $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ হয় তবে প্রত্যেকটি পূর্ণসংখ্যা $n (\geq 3)$ -এর জন্য প্রমাণ কর

$A^n = A^{n-2} + A^2 - I$. উক্ত হইতে A^{50} -এর মান নির্ণয় কর।

যদি $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ भए देखाऊ कि सबै पूर्ण सङ्ख्या $n (\geq 3)$ को लागि

$A^n = A^{n-2} + A^2 - I$ हुन्छ। A^{50} मूल्याङ्कन गर।

5. (a) If $x = \log \tan\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\theta}{2}\right)$ where θ is real, prove that $\theta = -i \log \tan\left(\frac{\pi}{4} + i \frac{x}{2}\right)$. 6

যদি $x = \log \tan\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\theta}{2}\right)$, যেখানে θ একটি বাস্তব, তাহলে প্রমাণ কর $\theta = -i \log \tan\left(\frac{\pi}{4} + i \frac{x}{2}\right)$.

যদি $x = \log \tan\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\theta}{2}\right)$ भए, जहाँ θ वास्तविक हुन, प्रमाण गर $\theta = -i \log \tan\left(\frac{\pi}{4} + i \frac{x}{2}\right)$

- (b) If $a, b, c, d > 0$ and $a + b + c + d = 1$, prove that 6

যদি $a, b, c, d > 0$ এবং $a + b + c + d = 1$ হয় তবে প্রমাণ কর

যদি $a, b, c, d > 0$ अनि $a + b + c + d = 1$ भए प्रमाण गर

$$\frac{a}{1+b+c+d} + \frac{b}{1+a+c+d} + \frac{c}{1+a+b+d} + \frac{d}{1+a+b+c} \geq \frac{4}{7}$$

6. (a) Solve the equation $x^4 - 4x^3 - 4x^2 - 4x - 5 = 0$ given that two roots α, β are connected by the relation $2\alpha + \beta = 3$. 6

$x^4 - 4x^3 - 4x^2 - 4x - 5 = 0$ সমীকরণটি সমাধান কর যেখানে প্রদত্ত আছে দুটি বীজ α এবং β ; $2\alpha + \beta = 3$ সম্পর্ক দ্বারা সংযুক্ত।

বুইবটা মূলহরু α, β সম্বন্ধ $2\alpha + \beta = 3$ দ্বারা জোড়िएको সমীকরণ $x^4 - 4x^3 - 4x^2 - 4x - 5 = 0$ लाई समाधान गर।

- (b) Find the eigen values and the corresponding eigen vectors of the following real matrix: 6

নিম্নলিখিত বাস্তব ম্যাট্রিক্সটির eigen মান এবং সংশ্লিষ্ট eigen ভেক্টরগুলি নির্ণয় কর:

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

आव्यूह $\begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$ को eigen मानहरू र अनि सम्बन्धित eigen सदिशहरू पत्ता लगाऊ।

—x—